SEXE AU PRÉSENT À TRAVERS LE CANADA

Faits saillants du sondage Sexe au présent par province

cbrc
Community-Based Research Centre
for Gay Men's Health

Investigaytors

Joshun Dulai
David Le
Olivier Ferlatte
Rick Marchand
Terry Trussler

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Qui a répondu au sondage? 2

Âge 2
Statut relationnel 2
Orientation sexuelle 3
Milieu de vie 3
Éducation 4
Ethnicité 4

Santé sexuelle 5

Utilisation du condom lors de la dernière relation sexuelle 5
Perception des risques de transmission du VIH 5
Relation anale sans condom (RASC) avec un partenaire au statut opposé ou inconnu 6
Utilisation d'Internet pour de l'information sur la santé sexuelle dans les 12 derniers mois 6
Dépistage pour les ITS dans les 12 derniers mois 7
Dépistage pour le VIH dans les 12 derniers mois 7
Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins de santé 8
Abandon d'un fournisseur de soins dû à son attitude 8
Satisfaction avec le fournisseur de soins de santé 9
Moyen d'accès aux soins de santé de routine 9

Focus sur l'âge 10

Satisfaction avec le fournisseur de soins de santé selon l'âge 10
Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins par âge 10
Internet pour des partenaires sexuels selon l'âge 10
Internet pour de l'information sur la santé sexuelle selon l'âge 11
Dépistage des ITS selon l'âge 11
Dépistage du VIH selon l'âge 11
Jamais dépisté pour le VIH selon l'âge 12
Ne savait pas où aller pour un dépistage selon l'âge 12
Relation anale sans condom (RASC) avec un partenaire au statut opposé ou inconnu selon l'âge 12

Focus sur le milieu de vie 13

Satisfaction avec le fournisseur de soins par milieu de vie 13
Relations sexuelles avec risque de transmission du VIH par milieu de vie 13
Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins par milieu de vie 13
Abandon d'un fournisseur de soins par milieu de vie 14
Internet pour des partenaires sexuels par milieu de vie 14
Internet pour de l'information sur la santé sexuelle par milieu de vie 14
Dépistage des ITS par milieu de vie 14
Dépistage pour le VIH par milieu de vie 15
Ne savait pas où aller pour un dépistage par milieu de vie 15
Avait une ITS par milieu de vie 15
Relation anale sans condom (RASC) Partenaire avec un statut opposé ou inconnu par milieu de vie 15

Discussion 16

Annexe des tableaux sur la santé sexuelle 17

INTRODUCTION

Sexe au présent 2011, le plus grand sondage canadien en ligne sur la santé gaie, a recueilli des données auprès de 8 607 hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, entre septembre 2011 et février 2012, dans chaque province et territoire. Le sondage a été élaboré pour enquêter sur les déterminants sociaux affectant la santé des hommes gais et bisexuels. Il était disponible sur Internet, en anglais et en français.

Sexe au présent à travers le Canada présente les faits saillants de chaque province. Le questionnaire a sondé une série de sujets interdépendants incluant les expériences avec les préjugés, la santé mentale, le support social, la santé sexuelle, la santé physique et l'utilisation d'Internet parmi les gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Cette analyse présente les variances démographiques et de santé sexuelle parmi les différentes provinces.

Dans ce rapport, nous avons choisi de présenter des données qui, nous l'espérons, seront utiles pour votre travail ou vos demandes de subventions. Nous avons cherché des données sur la santé sexuelle comme le port du condom, l'utilisation d'Internet, le risque associé au VIH ainsi que son dépistage, tout aussi bien que les problèmes concernant les fournisseurs de soins de santé. Nous avons examiné ces problèmes par âge – moins de 30 ans et plus de 30 ans – pour vous donner de l'information spécifique sur les jeunes gais. Nous avons aussi examiné les problèmes par milieu de vie – urbain et rural. Le rapport débute avec une section sur la démographie détaillant qui a répondu au sondage.

Parce que nous ne connaissons pas la taille de la population gaie, nous ne pouvons obtenir un échantillon représentatif. Nous avons recueilli un vaste échantillon diversifié d'hommes canadiens qui ont des relations sexuelles avec des hommes. De part leur faible participation, nous avons regroupé sous Territoires le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Avec une faible participation des Territoires, ainsi que de l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador, il faut utiliser avec précaution les différentes variances avec les autres provinces.

Sans des données sur la population qui incluent l'orientation sexuelle ou le genre, il est difficile d'obtenir une compréhension pan-canadienne des tendances en santé et des questions d'équité des minorités sexuelles. En produisant ce rapport ***Sexe au présent à travers le Canada : Faits saillants du sondage Sexe au présent par province***, nous espérons contribuer à un portrait national de la population des hommes gais et bisexuels.

SONDAGE SEXE AU PRESENT

Le sondage Sexe au présent a été initialement commandé par le Centre de contrôle des maladies de Colombie-Britannique en partenariat avec le Centre de Recherche Communautaire sur la santé des hommes gais (CRC) en 2002 en réponse à un pic des taux d'infection au VIH parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, en Colombie-Britannique. Le CRC a largement consulté Sigma Research à Londres pour la conception de leur sondage. Ils avaient mené pendant plus d'une décennie leurs sondages dans les festivals de fierté gaie et ils obtenaient maintenant de larges échantillons.

Le premier sondage en 2002 a recueilli plus de 1 500 réponses en une seule journée à la Fierté gaie de Vancouver. Le matériel promotionnel pour les participants au sondage peut avoir aidé à créer cet engouement. Avec un détour par les Fiertés gaies de Kelowna, Prince George et Victoria, Sexe au présent est devenu le plus grand sondage sur les hommes gais et bisexuels mené en Colombie-Britannique avec près de 1 900 participants. Les résultats ont contribué à plusieurs réflexions dans le domaine de la prévention du VIH pour lesquels il y avait peu de données. Suivant l'exemple de Sigma Research, le CRC a conclu que le sondage devait être mené régulièrement pour être capable de dégager des tendances. Ainsi, Sexe au présent est apparu annuellement pendant plusieurs années à la Fierté gaie de Vancouver.

2004 a été une année excitante en terme de développements. Le CRC a participé à différents festivals de la Fierté, récoltant un échantillon de 2 800 participants. Nous avons aussi lancé une étude pilote sur Internet pour comparer les résultats en personne et en ligne. Ne voyant que de légères différences d'échantillonnage, nous avons adopté une version uniquement en ligne en 2006, récoltant 1 330 réponses à travers la Colombie-Britannique, suivirent en 2007 et 2008, d'autres sondages en ligne. Les données au courant de ces années ont démontré un déclin dans la participation communautaire et une augmentation de la proportion d'hommes n'ayant jamais été dépisté pour le VIH.

En 2009, le CRC entreprit l'initiative d'enquêter sur les déterminants sociaux de santé avec le sondage. Parce que les recherches sur les déterminants de santé utilisent normalement de grands ensembles de données sur la population, nous avons inclus tout le Canada dans notre échantillonnage en ligne, avec des versions du sondage en anglais et en français. En 2010, nous avons reçu 7 920 réponses et 8 600 en 2011, faisant de Sexe au présent le plus grand sondage en ligne sur les hommes gais et bisexuels au Canada.

Avec sa dernière édition de Sexe au présent, le CRC a introduit son programme de jeunes enquêteurs gais (investigaytors). Ils ont aidé à l'élaboration et à la promotion du questionnaire en apprenant les rudiments de l'organisation et de l'analyse d'un sondage national sur la santé. Le programme incluait un camp d'entraînement où ils ont appris le fonctionnement d'un logiciel pour analyser les données du sondage. Ils ont publié des études, incluant leurs expériences, dans ***Under the Lens of the Investigaytors: Sex Now Survey 2011*** disponible en copie papier auprès de CATIE ou en ligne.

L'équipe de recherche du CRC a travaillé avec Sexe au présent afin de conserver l'aspect communautaire du processus de recherche et de s'assurer de sa rigueur. Les résultats du sondage de 2011 ont été utilisés abondamment dans le développement du rapport de la Santé publique de la Colombie-Britannique sur les tendances en matière de VIH parmi les hommes gais et bisexuels L'utilisation du code postal a permis un niveau d'analyse régionale auparavant impossible.

Le CRC a continué d'évoluer en tant que groupe de recherche communautaire. Jusqu'à maintenant, nous avons diffusé nos résultats d'enquête dans des rapports et dans la présentation de conférences. Nous sommes heureux d'avoir publié récemment **Evidence of a Syndemic among Young Canadian Gay and Bisexual Men: Uncovering the Associations between Anti-gay Experiences, Psychosocial Issues, and HIV Risk** dans *Aids and Behavior* (Oct. 2013) par l'équipe du CRC composée de Olivier Ferlatte, Travis Salway Hottes, Terry Trussler et Rick Marchand.

CBRC/CRC – QUI SOMMES-NOUS?

Le Centre de recherche communautaire sur la santé des hommes gais *(Community-Based Research Centre for Gay Men's Health)* à Vancouver (Colombie-Britannique) est un organisme communautaire à but non lucratif dont l'objectif est d'améliorer la santé des hommes gais par la recherche participative, l'échange et le transfert de connaissances, le développement de programmes innovateurs et des opportunités de formation. Nous visons le développement des connaissances sur la santé des hommes gais, guider la pratique communautaire et théoriser sur les enjeux sociaux et de santé.

Constitué en 1999 par un groupe d'hommes gais préoccupés par le manque de recherche locale pertinente pour combattre le VIH, notre mission est de faire avancer la santé des hommes gais à travers la recherche, l'apprentissage et le développement du leadership. Notre recherche actuelle se concentre sur les déterminants de santé chez les hommes gais et bisexuels et les tendances dans la culture des jeunes hommes gais. Nous croyons que les études basées sur les gens peuvent nous aider à localiser les lacunes structurelles et les inégalités sociales qui impactent la santé des gais, bisexuels, bi-spirituels et autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.

Nous diffusons nos résultats de recherche par des rapports que nous publions, des conférences et des assemblées et dans des revues scientifiques. Sur notre site Internet (cbrc.net), nous avons une variété d'articles, blogs et interviews sur les questions de santé des hommes gais, incluant la prévention du VIH et la promotion de la santé. Le CRC coordonne le Sommet sur la santé des hommes gais de Colombie-Britannique depuis 2005 où nous avons exploré l'écologie sociale, l'intersectionnalité, le stress de la minorité et le parcours de vie comme cadre pour répondre aux besoins en santé des gais, bisexuels et autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.

REMERCIEMENTS

Nous désirons remercier nos bailleurs de fonds sans qui ce projet n'aurait pas été possible.

Vancouver Foundation
La province de Colombie-Britannique

QUI A RÉPONDU AU SONDAGE?

ÂGE

La moyenne d'âge était de 43 ans, variant de 13 à 84 ans.

	N =	<30	30-44	45+
Colombie-Britannique	1804	22%	25%	53%
Alberta	1064	26%	30%	44%
Saskatchewan	289	24%	27%	49%
Manitoba	342	18%	26%	56%
Ontario	3366	20%	27%	53%
Québec	1048	24%	32%	44%
Nouveau-Brunswick	105	19%	32%	49%
Nouvelle-Écosse	223	26%	28%	47%
Île-du-Prince-Édouard	33	12%	21%	67%
Terre-Neuve et Labrador	85	44%	26%	31%
Territoires	23	26%	26%	48%
National	8382	22%	28%	50%

STATUT RELATIONNEL

Le statut relationnel des participants variait grandement.
Les trois plus communs étaient célibataire, en couple avec un homme et marié à une femme.

	N =	Célibataire	Marié à un homme	En couple avec un homme	Séparé, divorcé d'un homme	Marié à une femme	En couple avec une femme	Séparé, divorcé d'une femme	Autre
British Columbia	1804	45%	8%	22%	2%	12%	6%	5%	2%
Alberta	1064	46%	4%	19%	1%	16%	7%	6%	2%
Saskatchewan	289	48%	5%	19%	1%	16%	5%	5%	1%
Manitoba	342	44%	2%	16%	1%	23%	7%	7%	2%
Ontario	3366	42%	5%	20%	1%	19%	6%	6%	2%
Québec	1048	44%	5%	29%	2%	8%	6%	5%	2%
Nouveau-Brunswick	105	41%	6%	19%	3%	21%	5%	6%	0%
Nouvelle-Écosse	223	49%	6%	17%	0%	16%	5%	6%	1%
Île-du-Prince-Édouard	33	33%	3%	24%	0%	24%	6%	0%	9%
Terre-Neuve et Labrador	85	53%	7%	20%	1%	8%	7%	2%	1%
Territoires	23	52%	9%	13%	0%	13%	4%	9%	0%
National	8382	44%	5%	21%	1%	15%	6%	5%	2%

ORIENTATION SEXUELLE

La plupart des répondants s'identifiaient comme gais ou bisexuels.

	N =	Gai	Bi	Hétéro	Autre
Colombie-Britannique	1804	68%	28%	2%	2%
Alberta	1064	62%	35%	2%	1%
Saskatchewan	289	61%	36%	2%	1%
Manitoba	342	57%	40%	2%	1%
Ontario	3366	60%	36%	3%	1%
Québec	1048	77%	21%	1%	1%
Nouveau-Brunswick	105	68%	31%	2%	0%
Nouvelle-Écosse	223	66%	31%	1%	1%
Île-du-Prince-Édouard	33	58%	39%	0%	3%
Terre-Neuve et Labrador	85	66%	32%	0%	2%
Territoires	23	57%	44%	0%	0%
National	8382	65%	33%	2%	1%

MILIEU DE VIE

La plupart des répondants vivaient dans des régions urbaines ou en banlieue. Les provinces de l'Atlantique et les territoires nordiques ont contribué de façon disproportionnée avec des répondants vivant plus en banlieue, en milieu rural ou en région éloignée, que les autres régions.

	N =	Urbain	Banlieue	Rural	Région éloignée	Autre
Colombie-Britannique	1804	59%	28%	12%	1%	0%
Alberta	1064	61%	26%	11%	1%	1%
Saskatchewan	289	62%	13%	23%	2%	1%
Manitoba	342	61%	27%	9%	2%	0%
Ontario	3366	57%	28%	14%	1%	0%
Québec	1048	61%	26%	9%	4%	0%
Nouveau-Brunswick	105	51%	18%	28%	4%	0%
Nouvelle-Écosse	223	50%	22%	27%	1%	0%
Île-du-Prince-Édouard	33	36%	21%	39%	3%	0%
Terre-Neuve et Labrador	85	60%	19%	19%	2%	0%
Territoires	23	17%	13%	22%	39%	9%
National	8382	58%	26%	13%	2%	0%

ÉDUCATION

La majorité des participants avaient au moins une éducation post-secondaire.

	N =	Secondaire non terminé	Secondaire	Collégial ou universitaire non terminé	Collégial	Université	Doctorat
Colombie-Britannique	1804	4%	13%	28%	16%	34%	5%
Alberta	1064	5%	15%	31%	19%	27%	3%
Saskatchewan	289	4%	14%	32%	16%	29%	5%
Manitoba	342	6%	20%	27%	19%	25%	3%
Ontario	3366	4%	13%	24%	21%	33%	4%
Québec	1048	4%	12%	16%	20%	45%	4%
Nouveau-Brunswick	105	3%	17%	20%	20%	37%	3%
Nouvelle-Écosse	223	5%	10%	25%	16%	40%	4%
Île-du-Prince-Édouard	33	3%	24%	15%	15%	33%	9%
Terre-Neuve et Labrador	85	6%	13%	33%	14%	31%	4%
Territoires	23	0%	17%	35%	13%	30%	4%
National	8382	4%	14%	25%	19%	34%	4%

ETHNICITÉ

« Comment te décris-tu aux autres gars? »

	N =	Africain	Asiatique	Caribéen	Caucasien	Premières Nations	Inuit	Métis	Latino / Hispanique	Moyen-Orient	Des îles du Pacifique	Asiatique du Sud	Métisse	Autre
Colombie-Britannique	1804	0.2%	5.9%	0.6%	81.2%	2.2%	0.0%	0.7%	1.4%	0.5%	0.2%	1.4%	4.3%	1.3%
Alberta	1064	0.1%	2.8%	0.7%	88.8%	1.7%	0.1%	0.6%	0.8%	0.0%	0.2%	0.5%	2.5%	1.2%
Saskatchewan	289	0.0%	0.7%	0.3%	88.9%	3.1%	0.0%	3.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.4%
Manitoba	342	0.0%	2.0%	0.3%	88.9%	2.6%	0.0%	1.5%	0.3%	0.3%	0.0%	0.6%	2.0%	1.5%
Ontario	3366	0.2%	1.7%	0.9%	88.1%	0.8%	0.0%	0.3%	1.4%	1.0%	0.1%	1.1%	2.6%	1.7%
Québec	1048	0.4%	0.8%	0.3%	89.3%	1.0%	0.0%	0.4%	2.4%	0.8%	0.1%	0.3%	1.6%	2.7%
Nouveau-Brunswick	105	0.0%	1.0%	1.0%	95.2%	1.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%
Nouvelle-Écosse	223	2.2%	0.0%	0.0%	93.3%	0.4%	0.0%	0.4%	0.4%	1.3%	0.0%	0.0%	1.3%	0.4%
Île-du-Prince-Édouard	33	0.0%	3.0%	0.0%	93.9%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Terre-Neuve et Labrador	85	0.0%	0.0%	1.2%	94.1%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	1.2%
Territoires	23	0.0%	0.0%	0.0%	73.9%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.7%	13.0%
National	8382	0.3%	2.5%	0.7%	87.2%	1.4%	0.0%	0.6%	1.3%	0.6%	0.1%	0.9%	2.7%	1.6%

Cette section présente plusieurs plans de la santé sexuelle à l'aide de graphiques. Vous pouvez également retrouver ces mêmes résultats sous forme de tableaux à l'Annexe de la page 17.

Utilisation du condom lors de la dernière relation sexuelle



La majorité des hommes, dans toutes les provinces, ont déclaré avoir utilisé un condom lors de leur dernière relation anale (68%). Les provinces avec les taux les plus élevés d'utilisation du condom étaient l'Île-du-Prince-Édouard (79%), Terre-Neuve et Labrador (73%) et l'Ontario (71%). En moyenne, 1% des hommes étaient « incertains » de si des condoms avaient été utilisés avec leur dernier partenaire sexuel.

Perception des risques de transmission du VIH



La majorité des hommes ont déclaré n'avoir perçu aucun risque de transmission du VIH dans leurs relations sexuelles des 12 derniers mois (68%). Cependant, environ 10% étaient incertains. Les hommes de la Colombie-Britannique (23%), du Québec (22%) et de l'Alberta (22%) avaient les taux les plus élevés de perception des risques de transmission.

Relation anale sans condom (RASC) avec un partenaire au statut opposé ou inconnu



La majorité des hommes n'ont déclaré aucune relation anale sans condom (RASC) avec un partenaire dont le statut VIH était inconnu ou opposé dans les 12 derniers mois. L'Alberta, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique avaient les taux les plus élevés de RASC. Les nouvelles lignes directrices des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent d'utiliser Relation anale sans condom (RASC) plutôt que Relation anale non protégée (RANP).

Utilisation d'Internet pour de l'information sur la santé sexuelle dans les 12 derniers mois



Les provinces qui recherchaient le plus de l'information en ligne étaient la Colombie-Britannique (68%), le Nouveau-Brunswick (68%), Terre-Neuve et Labrador (66%) et la Nouvelle-Écosse (66%).

Dépistage pour les ITS dans les 12 derniers mois



Les taux de dépistage des infections transmises sexuellement (ITS) déclarés dans les 12 derniers mois varient selon les provinces. Les participants de la Colombie-Britannique (54%), du Québec (53%) et des Territoires (52%) avaient les taux les plus élevés de dépistage, alors que ceux de Terre-Neuve & Labrador (40%), du Nouveau-Brunswick (36%) et de Île-du-Prince-Édouard (27%) avaient les plus faibles.

Dépistage pour le VIH dans les 12 derniers mois



À l'échelle nationale, 48,8% des hommes ont déclaré avoir subi un test de dépistage du VIH dans les 12 derniers mois. Le Québec (49,8%), la Colombie-Britannique (49,2%) et l'Ontario (48,4%) ont déclaré les taux les plus élevés de dépistage du VIH dans les 12 derniers mois. Voir la page 14 : Jamais dépisté pour le VIH selon l'âge avec 33 % des gars de moins de 30 ans à l'échelle nationale ayant déclaré n'avoir jamais subi de dépistage pour le VIH.

Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins de santé



Dévoiler son orientation sexuelle à son principal fournisseur de soins de santé était similaire parmi toutes les provinces. Les hommes de la Colombie-Britannique (58%) et du Québec (60%) étaient en tête de liste.

Abandon d'un fournisseur de soins dû à son attitude



Les hommes de la Colombie-Britannique ont déclaré avoir abandonné leur fournisseur de soins à cause de la perception d'une attitude négative (14 %) plus souvent que ceux des autres provinces.

Satisfaction avec le fournisseur de soins de santé



La majorité des participants ont déclaré être satisfaits avec leurs fournisseurs de soins de santé. Cependant, l'insatisfaction excédait 25 % dans certaines provinces.

Moyen d'accès aux soins de santé de routine

	N =	Médecin de famille	Clinique sans rendez-vous	Urgences / Hôpital	Pas de soins de santé de routine disponible	Autre
Colombie-Britannique	1804	75%	22%	0%	2%	1%
Alberta	1064	69%	26%	1%	2%	2%
Saskatchewan	289	74%	19%	1%	4%	1%
Manitoba	342	74%	23%	1%	2%	1%
Ontario	3366	80%	15%	2%	2%	1%
Québec	1048	64%	22%	5%	5%	3%
Nouveau-Brunswick	105	86%	10%	2%	2%	1%
Nouvelle-Écosse	223	78%	15%	1%	4%	2%
Île-du-Prince-Édouard	33	88%	3%	0%	6%	3%
Terre-Neuve et Labrador	85	81%	13%	2%	2%	1%
Territoires	23	78%	9%	0%	9%	4%
National	8382	75%	19%	2%	3%	2%

La plus part des hommes ont déclaré que leurs soins de santé de routine étaient fournis par des médecins de famille. Les cliniques sans rendez-vous étaient le moyen d'accès suivant le plus commun. Les hommes des provinces de l'Atlantique voyaient un médecin de famille plus souvent que les hommes des autres régions. L'Alberta (26 %), le Manitoba (23 %) et le Québec / la Colombie-Britannique (22 %) avaient les taux les plus élevés d'hommes fréquentant les cliniques sans rendez-vous. Les hommes du Québec avaient le taux le plus élevé de fréquentation des urgences d'un hôpital pour obtenir des soins médicaux de routine (5%).

Fournisseur selon l'âge

Bien que la majorité des hommes ont déclaré être satisfaits avec leur fournisseur de santé, un peu moins d'hommes plus jeunes que d'hommes plus âgés étaient satisfaits dans la plupart des provinces.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	84%	85%
Alberta	75%	80%
Saskatchewan	77%	85%
Manitoba	71%	86%
Ontario	76%	84%
Québec	71%	76%
Nouveau-Brunswick	70%	79%
Nouvelle-Écosse	70%	81%
Île-du-Prince-Édouard	50%	69%
Terre-Neuve et Labrador	73%	77%
Territoires	83%	71%
National	77%	83%

Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins selon l'âge

Les hommes plus âgés étaient en général plus enclins à avoir dévoilé leur orientation sexuelle à leur fournisseur que les hommes plus jeunes, dans la plupart des provinces.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	43%	62%
Alberta	44%	45%
Saskatchewan	26%	38%
Manitoba	38%	42%
Ontario	39%	49%
Québec	52%	63%
Nouveau-Brunswick	50%	40%
Nouvelle-Écosse	25%	51%
Île-du-Prince-Édouard	75%	38%
Terre-Neuve et Labrador	32%	50%
Territoires	17%	53%
National	41%	52%

Internet pour des partenaires sexuels selon l'âge

Les hommes plus âgés ont déclaré utilisé Internet pour trouver des partenaires sexuels, dans les 12 derniers mois, plus souvent que les hommes plus jeunes, dans la plupart des provinces.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	75%	86%
Alberta	84%	93%
Saskatchewan	81%	88%
Manitoba	79%	94%
Ontario	87%	93%
Québec	81%	87%
Nouveau-Brunswick	70%	86%
Nouvelle-Écosse	81%	87%
Île-du-Prince-Édouard	75%	93%
Terre-Neuve et Labrador	76%	83%
Territoires	67%	88%
National	82%	91%

Internet pour de l'information sur la santé sexuelle selon l'âge

Les jeunes hommes gais ont déclaré utiliser Internet pour chercher de l'information sur la santé sexuelle, dans les 12 derniers mois, plus souvent que les hommes gais plus âgés, dans la plupart des provinces

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	75%	65%
Alberta	75%	61%
Saskatchewan	64%	54%
Manitoba	67%	60%
Ontario	75%	62%
Québec	75%	60%
Nouveau-Brunswick	70%	67%
Nouvelle-Écosse	79%	61%
Île-du-Prince-Édouard	50%	59%
Terre-Neuve et Labrador	84%	52%
Territoires	50%	47%
National	75%	62%

Dépistage des ITS selon l'âge

À l'exception du Manitoba, du Québec et du Nouveau-Brunswick, les jeunes hommes gais ont déclaré subir des tests de dépistage des ITS plus souvent que les hommes gais plus âgés

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	54%	53%
Alberta	58%	48%
Saskatchewan	44%	42%
Manitoba	46%	50%
Ontario	48%	45%
Québec	50%	54%
Nouveau-Brunswick	35%	37%
Nouvelle-Écosse	51%	43%
Île-du-Prince-Édouard	50%	24%
Terre-Neuve et Labrador	41%	40%
Territoires	67%	47%
National	51%	48%

Dépistage du VIH selon l'âge

Les taux de dépistage du VIH dans les 12 derniers mois étaient similaires entre les jeunes et les hommes plus âgés dans la plupart des provinces, sauf pour l'Alberta où significativement, plus de jeunes que d'hommes plus âgés ont déclaré un dépistage récent.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	55%	54%
Alberta	55%	47%
Saskatchewan	43%	43%
Manitoba	48%	46%
Ontario	48%	47%
Québec	50%	51%
Nouveau-Brunswick	30%	40%
Nouvelle-Écosse	40%	40%
Île-du-Prince-Édouard	50%	31%
Terre-Neuve et Labrador	41%	44%
Territoires	67%	35%
National	50%	48%

Jamais dépisté pour le VIH selon l'âge

Les jeunes hommes gais ont déclaré n'avoir jamais été dépistés pour le VIH plus souvent que les hommes plus âgés. La Saskatchewan et les provinces de l'Atlantique avaient les taux les plus élevés d'hommes n'ayant jamais subi de dépistage.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	31%	14%
Alberta	30%	21%
Saskatchewan	46%	30%
Manitoba	39%	27%
Ontario	34%	23%
Québec	30%	19%
Nouveau-Brunswick	40%	31%
Nouvelle-Écosse	42%	24%
Île-du-Prince-Édouard	50%	28%
Terre-Neuve et Labrador	43%	19%
Territoires	17%	18%
National	33%	21%

Ne savait pas où aller pour un dépistage selon l'âge

Les jeunes hommes gais ont déclaré ne pas savoir où aller pour un dépistage plus souvent que les hommes âgés dans la plupart des provinces. Les taux étaient plus élevés en Ontario, Nouvelle-Écosse et au Manitoba.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	21%	7%
Alberta	23%	8%
Saskatchewan	16%	8%
Manitoba	25%	8%
Ontario	26%	9%
Québec	18%	9%
Nouveau-Brunswick	5%	9%
Nouvelle-Écosse	28%	10%
Île-du-Prince-Édouard	0%	17%
Terre-Neuve et Labrador	24%	8%
Territoires	17%	12%
National	23%	9%

Relation anale sans condom (RASC) avec un partenaire au statut opposé ou inconnu selon l'âge

En général, parmi toutes les provinces, 20 à 30% des participants ont déclaré des relations anales sans condom avec un partenaire au statut opposé ou inconnu dans les 12 derniers mois. Les taux les plus élevés ont été rapportés en Alberta.

	Moins de 30 ans	30 ans et plus
N =	1866	6516
Colombie-Britannique	29%	33%
Alberta	36%	33%
Saskatchewan	27%	30%
Manitoba	21%	26%
Ontario	31%	28%
Québec	28%	30%
Nouveau-Brunswick	30%	26%
Nouvelle-Écosse	30%	33%
Île-du-Prince-Édouard	0%	24%
Terre-Neuve et Labrador	19%	40%
Territoires	33%	6%
National	30%	30%

Les participants devaient identifier leur milieu de vie parmi les suivants : milieu urbain, banlieue, milieu rural, région éloignée ou autre. Dans les prochains tableaux, Urbain inclut milieu urbain et banlieue; Rural inclut milieu rural et région éloignée.

Satisfaction avec le fournisseur de soins par milieu de vie

La satisfaction avec les fournisseurs de soins de santé était à peu près la même entre les milieux urbains et ruraux dans la plupart des provinces sauf au Manitoba et en Saskatchewan

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	85%	85%
Alberta	79%	78%
Saskatchewan	86%	78%
Manitoba	84%	74%
Ontario	82%	80%
Québec	75%	77%
Nouveau-Brunswick	78%	76%
Nouvelle-Écosse	78%	80%
Île-du-Prince-Édouard	63%	71%
Terre-Neuve et Labrador	79%	61%
Territoires	57%	79%
National	82%	80%

Relations sexuelles avec risque de transmission du VIH par milieu de vie

Les hommes vivant dans des milieux urbains étaient moins susceptibles de rapporter des relations sexuelles à risque de transmission du VIH dans les 12 derniers mois, dans la plupart des provinces.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	34%	26%
Alberta	33%	29%
Saskatchewan	27%	17%
Manitoba	29%	23%
Ontario	33%	25%
Québec	35%	28%
Nouveau-Brunswick	35%	24%
Nouvelle-Écosse	28%	33%
Île-du-Prince-Édouard	26%	21%
Terre-Neuve et Labrador	27%	33%
Territoires	29%	21%
National	33%	26%

Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins par milieu de vie

Les hommes vivant dans des milieux ruraux étaient moins susceptibles d'avoir dévoilé leur sexualité à leur principal fournisseur de soins dans la plupart des provinces

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	59%	47%
Alberta	46%	33%
Saskatchewan	38%	27%
Manitoba	41%	39%
Ontario	48%	40%
Québec	62%	49%
Nouveau-Brunswick	40%	46%
Nouvelle-Écosse	46%	39%
Île-du-Prince-Édouard	32%	57%
Terre-Neuve et Labrador	42%	44%
Territoires	71%	29%
National	51%	41%

Abandon d'un fournisseur de soins par milieu de vie

Il y avait peu de différence entre les taux en milieu urbain et rural d'abandon d'un fournisseur de soins de santé à cause d'une attitude négative parmi toutes les provinces, sauf pour le Manitoba et la Saskatchewan.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	15%	11%
Alberta	11%	8%
Saskatchewan	13%	7%
Manitoba	9%	15%
Ontario	10%	9%
Québec	10%	8%
Nouveau-Brunswick	6%	15%
Nouvelle-Écosse	6%	18%
Île-du-Prince-Édouard	0%	0%
Terre-Neuve et Labrador	8%	17%
Territoires	0%	7%
National	11%	10%

Internet pour de l'information sur la santé sexuelle par milieu de vie

Il y avait une tendance similaire parmi les provinces sur l'utilisation d'Internet pour la recherche d'information sur la santé sexuelle. Les hommes urbains ont utilisé Internet plus souvent que ceux vivant en milieu rural.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	68%	62%
Alberta	65%	63%
Saskatchewan	59%	49%
Manitoba	62%	59%
Ontario	65%	60%
Québec	65%	57%
Nouveau-Brunswick	68%	67%
Nouvelle-Écosse	70%	56%
Île-du-Prince-Édouard	63%	50%
Terre-Neuve et Labrador	64%	72%
Territoires	57%	36%
National	66%	60%

Internet pour des partenaires sexuels par milieu de vie

En général, il n'y avait que peu de différences entre les participants de milieux urbain et rural sur l'utilisation d'Internet pour trouver des partenaires sexuels, dans toutes les provinces sauf en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	84%	85%
Alberta	91%	90%
Saskatchewan	84%	93%
Manitoba	91%	90%
Ontario	92%	93%
Québec	85%	89%
Nouveau-Brunswick	85%	79%
Nouvelle-Écosse	84%	90%
Île-du-Prince-Édouard	84%	100%
Terre-Neuve et Labrador	84%	67%
Territoires	86%	79%
National	88%	90%

Dépistage des ITS par milieu de vie

En général, plus d'hommes en milieu urbain que d'hommes en milieu rural ont subi un dépistage des ITS dans les 12 derniers mois avant le sondage, pour toutes les provinces.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	56%	38%
Alberta	51%	49%
Saskatchewan	45%	35%
Manitoba	51%	39%
Ontario	47%	37%
Québec	54%	42%
Nouveau-Brunswick	42%	24%
Nouvelle-Écosse	51%	30%
Île-du-Prince-Édouard	16%	43%
Terre-Neuve et Labrador	42%	33%
Territoires	43%	57%
National	50%	39%

Dépisté pour le VIH par milieu de vie

Généralement, les hommes en milieu urbain subissaient un dépistage pour le VIH dans les 12 derniers mois plus souvent que les hommes en milieu rural, pour toutes les provinces.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	56%	41%
Alberta	50%	47%
Saskatchewan	46%	34%
Manitoba	48%	33%
Ontario	48%	43%
Québec	52%	39%
Nouveau-Brunswick	43%	27%
Nouvelle-Écosse	45%	26%
Île-du-Prince-Édouard	16%	57%
Terre-Neuve et Labrador	43%	39%
Territoires	43%	43%
National	50%	40%

Avait une ITS par milieu de vie

Les hommes en milieu urbain ont rapporté avoir eu une ITS dans les 12 derniers mois plus souvent que les hommes en milieu rural, pour toutes les provinces.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	10%	5%
Alberta	9%	6%
Saskatchewan	3%	6%
Manitoba	5%	3%
Ontario	7%	5%
Québec	12%	5%
Nouveau-Brunswick	10%	12%
Nouvelle-Écosse	8%	0%
Île-du-Prince-Édouard	0%	7%
Terre-Neuve et Labrador	3%	0%
Territoires	14%	0%
National	8%	5%

Ne savait pas où aller pour un dépistage par milieu de vie

Les données varient selon les provinces, mais ceux vivant en milieu rural ont rapporté ne pas savoir où aller plus souvent que ceux en milieu urbain.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	10%	9%
Alberta	11%	18%
Saskatchewan	8%	16%
Manitoba	10%	15%
Ontario	13%	13%
Québec	11%	10%
Nouveau-Brunswick	6%	15%
Nouvelle-Écosse	14%	16%
Île-du-Prince-Édouard	21%	7%
Terre-Neuve et Labrador	15%	17%
Territoires	14%	14%
National	11%	13%

Relation anale sans condom (RASC) Partenaire avec un statut opposé ou inconnu par milieu de vie

Environ 20 % à 30 % des gais et des autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ont rapporté avoir eu des RASC dans les 12 derniers mois. Les taux les plus élevés étaient en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

	Urbain	Rural
N =	7107	1245
Colombie-Britannique	32%	28%
Alberta	35%	30%
Saskatchewan	30%	25%
Manitoba	25%	28%
Ontario	29%	27%
Québec	29%	30%
Nouveau-Brunswick	26%	27%
Nouvelle-Écosse	30%	36%
Île-du-Prince-Édouard	32%	7%
Terre-Neuve et Labrador	22%	61%
Territoires	14%	14%
National	30%	28%

DISCUSSION

Sur la base de ces résultats, il semble y avoir d'importantes variations dans les modèles de santé sexuelle des participants au sondage, parmi les différentes provinces. Quelques unes de ces différences exposent les conditions structurelles au sein des provinces comme la disponibilité et l'accessibilité aux services de dépistage.

Les taux les plus élevés d'utilisation du condom lors du plus récent rapport sexuel des participants ont été noté en Ontario et dans les provinces maritimes.

Les taux les plus élevés d'utilisation d'Internet pour trouver de l'information sur la santé sexuelle étaient en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick.

Les taux les plus élevés de dépistage du VIH et de ITS étaient en Colombie-Britannique, au Québec et dans les Territoires. Les taux les plus faibles étaient à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick.

Les taux les plus élevés de participants déclarant avoir dévoilé leur sexualité à un fournisseur principal de soins de santé étaient en Colombie-Britannique et au Québec. Cependant, la Colombie-Britannique a aussi le taux le plus élevé d'hommes déclarant avoir abandonné un fournisseur de soins à cause de son attitude.

La satisfaction à l'égard des fournisseurs de soins de santé était plus élevée en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard et les Territoires avaient le nombre le plus élevé d'hommes déclarant ne pas avoir accès à des soins de santé de routine.

Les analyses par âge ont démontré que les hommes de moins de 30 ans étaient plus susceptibles de déclarer n'avoir jamais été dépisté pour le VIH et ne savaient pas où aller pour subir un test de dépistage.

Les hommes plus âgés étaient plus susceptibles de déclarer qu'ils étaient satisfaits avec leur fournisseur de soins de santé, d'avoir dévoilé leur sexualité à leur fournisseur de soins et à utiliser Internet pour chercher des relations sexuelles.

Les hommes vivant dans les régions urbaines étaient plus susceptibles de déclarer être satisfaits et d'avoir dévoilé leur sexualité à leur fournisseur de soins, s'adonner à des activités sexuelles risquées, utiliser Internet pour chercher de l'information sur la santé sexuelle, se faire dépister pour les ITS et le VIH, et à avoir une ITS.

Les hommes vivant dans des milieux ruraux étaient plus susceptibles de déclarer ne pas savoir où aller pour un dépistage.

Il faut comprendre que toutes ces variances proviennent de processus sociaux complexes et en mutation. Nous avons l'impression qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ce qui influence la santé des hommes gais.

Utilisation du condom lors de la dernière relation sexuelle

	Avec condom	Sans condom	Incertain
Colombie-Britannique	65%	35%	1%
Alberta	66%	34%	1%
Saskatchewan	61%	38%	2%
Manitoba	69%	30%	1%
Ontario	71%	29%	1%
Québec	68%	32%	1%
Nouveau-Brunswick	64%	36%	0%
Nouvelle-Écosse	70%	29%	1%
Île-du-Prince-Édouard	79%	18%	3%
Terre-Neuve et Labrador	73%	26%	1%
Territoires	65%	35%	0%
National	68%	31%	1%

RASC avec un partenaire au statut opposé ou inconnu

	Pas de RASC	RASC
Colombie-Britannique	68%	32%
Alberta	66%	34%
Saskatchewan	71%	29%
Manitoba	75%	25%
Ontario	71%	29%
Québec	71%	29%
Nouveau-Brunswick	73%	27%
Nouvelle-Écosse	68%	32%
Île-du-Prince-Édouard	79%	21%
Terre-Neuve et Labrador	69%	31%
Territoires	87%	13%
National	70%	30%

Perception des risques de transmission du VIH

	Aucun risque	Certains risques	Incertain
Colombie-Britannique	67%	23%	10%
Alberta	67%	22%	10%
Saskatchewan	76%	17%	8%
Manitoba	72%	18%	10%
Ontario	68%	21%	10%
Québec	66%	22%	12%
Nouveau-Brunswick	69%	20%	11%
Nouvelle-Écosse	71%	18%	11%
Île-du-Prince-Édouard	76%	12%	12%
Terre-Neuve et Labrador	72%	15%	13%
Territoires	78%	4%	17%
National	68%	21%	10%

Utilisation d'Internet pour de l'information sur la santé sexuelle dans les 12 derniers mois

	Sans Internet	Avec Internet
Colombie-Britannique	33%	68%
Alberta	36%	64%
Saskatchewan	44%	56%
Manitoba	39%	61%
Ontario	35%	65%
Québec	37%	63%
Nouveau-Brunswick	32%	68%
Nouvelle-Écosse	35%	66%
Île-du-Prince-Édouard	42%	58%
Terre-Neuve et Labrador	34%	66%
Territoires	52%	48%
National	35%	65%

Dépistage pour les ITS dans les 12 derniers mois

	Non dépisté	Dépisté
Colombie-Britannique	46%	54%
Alberta	50%	50%
Saskatchewan	58%	42%
Manitoba	51%	49%
Ontario	55%	46%
Québec	47%	53%
Nouveau-Brunswick	64%	36%
Nouvelle-Écosse	55%	45%
Île-du-Prince-Édouard	73%	27%
Terre-Neuve et Labrador	60%	40%
Territoires	48%	52%
National	51%	49%

Dévoilement de sa sexualité au principal fournisseur de soins santé

	Non dévoilé	Dévoilé	Incertain
Colombie-Britannique	39%	58%	3%
Alberta	53%	44%	2%
Saskatchewan	62%	35%	3%
Manitoba	58%	41%	2%
Ontario	51%	47%	2%
Québec	37%	60%	3%
Nouveau-Brunswick	54%	42%	4%
Nouvelle-Écosse	54%	44%	2%
Île-du-Prince-Édouard	55%	42%	3%
Terre-Neuve et Labrador	52%	42%	6%
Territoires	52%	44%	4%
National	48%	50%	3%

Dépistage pour le VIH dans les 12 derniers mois

	Non dépisté	Dépisté
Colombie-Britannique	45.8%	49.2%
Alberta	50.7%	47.9%
Saskatchewan	57.1%	42.9%
Manitoba	53.5%	46.5%
Ontario	52.8%	48.4%
Québec	49.3%	49.8%
Nouveau-Brunswick	61.9%	38.1%
Nouvelle-Écosse	60.1%	39.9%
Île-du-Prince-Édouard	66.7%	33.3%
Terre-Neuve et Labrador	57.6%	42.4%
Territoires	56.5%	43.5%
National	51.2%	48.8%

Abandonné un fournisseur de soins à cause de son attitude

	Abandonné	Incertain
Colombie-Britannique	14%	2%
Alberta	10%	2%
Saskatchewan	12%	4%
Manitoba	10%	4%
Ontario	10%	2%
Québec	9%	2%
Nouveau-Brunswick	9%	0%
Nouvelle-Écosse	9%	2%
Île-du-Prince-Édouard	0%	0%
Terre-Neuve et Labrador	9%	1%
Territoires	9%	0%
National	11%	2%

Satisfaction à l'égard du fournisseur de soins de santé

	Non satisfait	Satisfait
Colombie-Britannique	15%	85%
Alberta	21%	79%
Saskatchewan	17%	83%
Manitoba	17%	83%
Ontario	18%	82%
Québec	25%	75%
Nouveau-Brunswick	23%	77%
Nouvelle-Écosse	22%	79%
Île-du-Prince-Édouard	33%	67%
Terre-Neuve et Labrador	25%	75%
Territoires	26%	74%
National	19%	81%



cbrc
Community-Based Research Centre
for Gay Men's Health

970 Rue Burrard, Bureau 234,
Vancouver, Colombie-Britannique
Canada V6Z 2R4

www.cbrc.net
Téléphone: 604 568-7478
Courriel: info@cbrc.net

Community Based Research Centre
@CBRCtweets

SondageGaiCanada
@Sexeaupresent