

sexe
au /
PRÉSENT



**Le traitement du
VIH à action
prolongée est
arrivé!**



**Mais son
accessibilité doit
être améliorée.**

Le traitement du VIH à action prolongée offre de nouvelles manières de bien vivre avec le VIH.

- Il suffit de deux injections tous les mois ou tous les deux mois (cabotégavir + ripilvirine).
- On ne parle pas d'un stade expérimental ou d'une innovation à venir. C'est réel. Ça existe. Et c'est approuvé par Santé Canada.
- Des options à action prolongée plus complètes vont bientôt être proposées sous forme de comprimés et de préparations injectables.



**Les comprimés
quotidiens fonctionnent
toujours, mais il existe
d'autres options.**

**Ça vous intéresse? Le
traitement du VIH
injectable à action
prolongée est peut-être
pour vous.**





**Lors de Sexe au présent
2024, nous avons interrogé
231 personnes 2S/GBTQ+
vivant avec le VIH sur leur
intérêt pour le traitement du
VIH à action prolongée.**

Voici leurs réponses...

Préférence de traitement

Deux personnes interrogées sur cinq ont dit préférer un traitement injectable à action prolongée aux comprimés oraux quotidiens.

Je préfère les
comprimés
quotidiens
28 %




Je préfère le
traitement
injectable à
action prolongée
42 %

Je ne sais pas
quel traitement
je préfère
30 %

Accès au traitement

Seules 10 % des personnes préférant un traitement injectable à action prolongée y avaient accès.



Cela signifie que 9 personnes sur 10 souhaitant en bénéficier ne pouvaient pas y avoir accès.

Avantages du traitement

Un traitement à action prolongée peut faciliter la vie des personnes séropositives. Les personnes interrogées ont nommé les avantages suivants : moins d'inquiétude liée au VIH, pas de rappels quotidiens de la séropositivité, davantage de liberté et une plus grande confidentialité.



Potentielles hésitations

Le traitement à action prolongée ne convient pas à tout le monde.

Certaines personnes se demandent :
devrai-je me rendre plus souvent à la
clinique? Est-ce vraiment aussi
efficace que les comprimés
quotidiens? Quels sont les effets
secondaires?



Alors, que faire?

- Faites passer le message sur l'accès et les obstacles au traitement en partageant cette publication!
- Informez-vous sur le traitement du VIH à action prolongée et son fonctionnement sur le site de CATIE : bit.ly/4eNe23i
- Si vous pensez que ce traitement vous conviendrait, parlez-en à un·e pair·e, à votre gestionnaire ou à votre prestataire de soins de santé!



Vous souhaitez en savoir plus?

Pour en savoir plus sur l'enquête
Sexe au présent, visitez
fr.cbrc.net/sexe_au_present



Cette ressource a été créée par trois étudiant·e·s en communication en matière de santé à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, avec le soutien du personnel du CBRC.

Mercedes R.,

maîtrise en sciences de la santé communautaire

Mansimran K.,

maîtrise en sciences de la santé, recherche translationnelle

Sam VJ.,

*maîtrise en santé publique, sciences sociales
et comportementales de la santé*