



Images used are stock photos and the associated messaging may not represent the personal situation, views or beliefs of the people in the images.

ការណែនាំអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ការធ្វើតេស្ត ការព្យាបាល និងការរក្សាសុខភាពល្អ

អំពីធនធាននេះ

ការណែនាំនេះ គឺដើម្បីជួយ អ្នកឱ្យយល់ដឹងអំពីដំណើរការចាប់ពីការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (ជញ្ជីកញ្ចប់ គេហៅថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B) ដល់ការរស់នៅបានល្អប្រសើរពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ (ពេញមួយជីវិត)។
ការណែនាំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានហានិភ័យប្រូបាប្លូ ត្រូវបានធ្វើវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យ ឃើញមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ។

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងការណែនាំនេះ គឺជាព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានបំណងជំនួសឱ្យការផ្តល់ ជំនួយខាងវេជ្ជសាស្ត្រឡើយ។ Hepatitis Australia ជម្រុញលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានទាំងអស់ ស្វែងរក ជំនួយខាង វេជ្ជសាស្ត្រឯករាជ្យ មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូន។

ខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្ត
រកមេលដំងើរលាក់
ប្លែមប្រភេទ B



ខ្ញុំគិតថាយើងគួរ
ធ្វើតេស្តរកមេល
ដំងើរលាក់ប្លែម
ប្រភេទ B

លទ្ធផលតេស្ត



អវិជ្ជមាន
មានភាពស៊ាំនឹងជំងឺ



អ្នក បានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ
មានភាពស៊ាំនឹងជំងឺ និង
មិនអាចឆ្លងជំងឺរលាក់ប្លែម
ប្រភេទ B



អវិជ្ជមាន
មិនស៊ាំនឹងជំងឺ



ទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ



ជាស្រឡះ
មានភាពស៊ាំនឹងជំងឺ



ធ្វើតេស្តក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្ស
ដែលរស់នៅជាមួយ អ្នក



វិជ្ជមាន



ធ្វើតេស្តប្លែម

ធ្វើតេស្តក្រុមគ្រួសារ ដៃគូ និង
មនុស្សដែលរស់នៅជាមួយ អ្នក



សូមទៅជួបគ្រូពេទ្យ
រៀងរាល់ 6 ទៅ 12 ខែម្តង

បរិភោគអាហារដែលមាន
សុខភាពល្អ ហាត់ប្រាណ និង
កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
គ្រឿងស្រវឹង និងការជក់បារី



ទទួលការព្យាបាល បើសិន
ចាំបាច់

1

ត្រូវការគិតមើលបើសិន អ្នកគួរ ធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ក្រុមមនុស្សខាងក្រោមនេះ គួរធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B¹

- ក្រុមគ្រួសារ ដៃគូ និងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- មនុស្សកើតនៅក្នុងតំបន់មួយនៃតំបន់ដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចនៅលើផែនទីខាងក្រោម²
- ជនជាតិដើម ឬអ្នកកោះ: Torres Strait
- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
- ទារក និងកុមារដែលមានអាយុលើសពី ១ ខែ កើតពីម្តាយដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- មនុស្សដែលនឹងត្រូវទទួលការព្យាបាល ប្រើថ្នាំគីមី ការព្យាបាលភាពស្មុំនឹងជំងឺចុះខ្សោយ ឬការលាងឈាម
- អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពដែលអនុវត្តនីតិវិធីដែលប្រើដៃពាក់ស្រោមដៃអាចប៉ះពាល់ឧបករណ៍មុត
- សមាជិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
- អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV និង/ឬ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C
- អ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើននាក់ ដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការមេរោគ
- អ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំញៀន
- អ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ
- បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស
- អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ
- មនុស្សមួយចំនួនដែលមានសញ្ញា ឬរោគសញ្ញានៃការខូចថ្លើម
- អ្នកដែលមានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមានជំងឺថ្លើម។

តំបន់នានាដែលមានការរាតត្បាតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីកម្រិតមធ្យម ទៅខ្ពស់



¹ អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចប្រើថ្នាំបង្ការមេរោគបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចប្រើថ្នាំបង្ការមេរោគបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចប្រើថ្នាំបង្ការមេរោគបាន។

² អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចប្រើថ្នាំបង្ការមេរោគបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចប្រើថ្នាំបង្ការមេរោគបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចប្រើថ្នាំបង្ការមេរោគបាន។



2

សូមស្នើសុំគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនមែនជាផ្នែកនៃការធ្វើតេស្តឈាមធម្មតាទេ។ បើសិន អ្នកមិនដឹងថា អ្នកបានធ្វើតេស្តមិនមកនោះ អ្នកត្រូវសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។ គ្រូពេទ្យ GP របស់អ្នក នឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តឈាម ដែលនឹងប្រាប់ពួកគេថា តើ អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់ ហើយបើមិនមានទេ ថា តើ អ្នកមានភាពស៊ាំនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬទេ។

នៅពេលដែល ការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មួយចំនួនធំអាចមានភាពច្របូកច្របល់ គ្រូពេទ្យ GP របស់អ្នកអាចពេញចិត្តដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញទៅនឹងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលងាយស្រួលនេះ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ ASHM: <https://ashm.org.au/products/product/1976963402>

សេវាកម្មបកប្រែភាសា

បើសិន អ្នកត្រូវការជំនួយដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក អ្នកអាចមានអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់មកកាន់ទីណាត់ជួបរបស់អ្នក ឬបកប្រែ តាមទូរស័ព្ទ។ នេះគឺជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ TIS (សេវាកម្មបកប្រែភាសា សរសេរ និងនិយាយ) National។³ អ្នកគួរប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកថា អ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់នៅពេល អ្នកធ្វើការណាត់ជួប។

ខណៈពេលក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិអាចជាអ្នកគាំទ្រល្អនៅពេល អ្នកទៅជួបគ្រូពេទ្យ យើងខ្ញុំសូមណែនាំ អ្នកទទួលបានអ្នកបកប្រែភាសាដែលមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយ អ្នកទាក់ទងជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។ ការសម្រេចចិត្តលើសុខភាពអាចជាការលំបាកក្នុងការធ្វើ ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែល អ្នកអាចយល់ដឹងអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីជួយ អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ។ អ្នកបកប្រែភាសារបស់ TIS National គឺជាអ្នកជំនាញដែលបានបណ្តុះបណ្តាល ហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការប្រព័ន្ធពីមានសុគតស្នាញ។

វិបស៊ីប៊ី៖ www.tisnational.gov.au
ហៅទូរស័ព្ទលេខ 131 450 ដើម្បីទទួលបានអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយអស់ថ្លៃហៅទូរស័ព្ទដូចក្នុងតំបន់។

3

ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នក។

ការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចបង្ហាញលទ្ធផលមួយ ក្នុងចំណោមលទ្ធផល បួនផ្សេងៗគ្នា។

1 អវិជ្ជមាន មានភាពស៊ាំនឹងជំងឺ (បានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ)
 អ្នកបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយ អ្នកមិនអាចឆ្លងជំងឺនេះទេ។

2 អវិជ្ជមាន មិនស៊ាំនឹងជំងឺ
 អ្នកមិនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយមិនដែល បានចាក់ថ្នាំបង្ការឡើយ។ អ្នកអាចសាកសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពី ការចាក់ថ្នាំបង្ការ ដូច្នោះ អ្នកមិនអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នា ពេលអនាគតឡើយ។

3 ជាស្រឡះ មានភាពស៊ាំនឹងជំងឺ
 អ្នកធ្លាប់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B កាលពីមុន ប៉ុន្តែរាងកាយ របស់អ្នកបានឱ្យវាជាស្រឡះដោយធម្មជាតិ។ អ្នកមិនមានជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃទេ។ អ្នកគួរគិតពិចារណាអំពីការប្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ដៃគូរបស់អ្នក និងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយ អ្នក ដើម្បីឱ្យពួកគេ អាចធ្វើតេស្ត។ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចទាក់ទងមកពួកគេដោយមិន បញ្ចេញឈ្មោះ បើសិន អ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រាប់ពួកគេ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីកត់សម្គាល់ថា អ្នកដែលមាន ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលបានជាស្រឡះហើយ អាចកើត កញ្ជ្រោលឡើងខ្លាំងនៅពេលព្យាបាល ប្រើថ្នាំគីមី ឬ ព្យាបាល ដោយ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនឹងជំងឺចុះខ្សោយ។ អ្នកអាចត្រូវការការព្យាបាល បន្ថែមសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B បើសិន អ្នកប្រើថ្នាំទាំងនេះ។

4 ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វិជ្ជមាន
 វាទំនងថា អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ។ ជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃជាជំងឺកើតមានពេញមួយជីវិត ប៉ុន្តែមានកិច្ចការ ទាំងឡាយដែល អ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយ អ្នករក្សាសុខភាពល្អ។

មិនមែនបានព្យាបាលទេ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចបំផ្លាញថ្លើម របស់អ្នក និងបណ្តាលឱ្យមានជំងឺក្រិនថ្លើម (ស្នាមក្រិនថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ), ជំងឺថ្លើមជំងឺមហារីកថ្លើម និងជំងឺខ្សោយថ្លើម។ មិនមាន ការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃទេ ប៉ុន្តែបើសិនវា កំពុងធ្វើឱ្យខូចថ្លើមរបស់អ្នក មានវិធីព្យាបាលដែល អ្នកអាចប្រើ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និង


កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីវីរុសនេះ។ បើសិនអ្នកបានប៉ះពាល់នឹងវីរុសនាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកនឹង ចាំបាច់ត្រូវការធ្វើតេស្តមួយផ្សេងទៀត ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ ដើម្បីកំណត់ថាតើ អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃឬអត់។

អ្នក មិនចាំបាច់ ធ្វើតាម ជំហានបន្ទាប់ទេ



ធ្វើតាម ជំហានបន្ទាប់





4 ធ្វើតេស្តថ្លើម

គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក នឹងត្រូវការធ្វើតេស្តមួយចំនួន ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើថ្លើមរបស់អ្នកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។ ការណ៍នេះ ភាគច្រើនទំនងជាមានការធ្វើតេស្តឈាមមួយចំនួន និងការថតអេកូ (ultrasound) ឬឧបករណ៍ស្កេនថ្លើម Fibroscan® (ការធ្វើតេស្តដោយគ្មានការឈឺចាប់ដែលប្រើរញ្ជីដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើថ្លើមរឹងប៉ុណ្ណា)។⁴

ហើយនេះនឹងជួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឱ្យបានយល់ដឹងពីរបៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B កំពុងមានផលប៉ះពាល់ដល់ អ្នក និងថាតើអ្នកត្រូវការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលឬអត់។

5 ធ្វើតេស្តក្រុមគ្រួសារ ដៃគូ និងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយ អ្នក

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ត្រូវបានចម្លងជាទូទៅច្រើនបំផុតតាមកំណើតកូន។ វាក៏អាចចម្លងតាមឈាមទៅឈាមផងដែរ ការប៉ះពាល់ ឬការរួមភេទដោយគ្មានស្រោមអនាម័យ។ អ្នកត្រូវគិតពីការណាអំពីការប្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ដៃគូរបស់អ្នក និងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយ អ្នកថា អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើតេស្ត និងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។

ការមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនមានន័យថា អ្នកមិនអាចមានកូន ឬធ្វើអ្វីៗដូចជាការទទួលបានអាហាររួមគ្នាជាមួយគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទេ។ វិធីល្អបំផុតដែលក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអាចការពារខ្លួនពួកគេពីការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺតាមរយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។

គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចទាក់ទងពួកមកគេដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះ បើសិន អ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រាប់ពួកគេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការសម្ងាត់ និង ការលាតត្រដាង សូមចូលមើលរ៉ូបសែប www.hepatitisaustralia.com/Listing/Category/your-rights-and-responsibilities

អ្នកមិនអាចចម្លងរោគតាមរយៈ៖

					
ការឱប ឬការប្រើប្រាស់	ការបរិភោគអាហារ និងការប្រើប្រាស់ប្រដាប់បរិភោគរួមគ្នា	ការបរិភោគអាហារដែលរៀបចំដោយនរណាម្នាក់ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B	សត្វល្អិត ឬសត្វទិចខា ដែលរួមមានមូស	ការប្រើបន្ទប់ទឹក ក្បាលទឹកផ្កាឈូក ឬបង្គន់រួមគ្នា	ការក្អក ឬកណ្តាស

បើសិន អ្នកមានផ្ទៃពោះ ហើយមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នោះ ទារករបស់អ្នកគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង បន្ទាប់ពីបានកើតមក។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ មានផ្ទុក អង្គបដិប្រាណនៅក្នុងឈាមដើម្បីការពារប្រឆាំងមេរោគសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលជាអង្គបដិប្រាណជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនឹងជំងឺប្រឆាំងនឹងមេរោគ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ រួមជាមួយវគ្គចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលចាប់ផ្តើមតាមពេលវេលាដូចគ្នាគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារទារកប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ ស្រ្តីមួយចំនួនក៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរពីការព្យាបាលនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងរុស្ស៊ីទៅកូនរបស់ពួកគេ។⁵

6

បរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ហាត់ប្រាណនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ គ្រឿងស្រវឹងនិងការជក់បារី

វាមានសារៈសំខាន់ផងដែរ ដើម្បីថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នក ការបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ការហាត់ប្រាណ និងការចៀសវាង ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង និងការជក់បារី

គ្រឿងស្រវឹង បារី និងការលើសទម្ងន់ ធ្វើឱ្យខូចថ្លើមរបស់អ្នក ដែលអាចក្លាយជាពិសេស បើសិន អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដោយសារតែវីរុសអាចធ្វើឱ្យ ខូចថ្លើមរបស់អ្នកផងដែរ។ បើសិន អ្នកត្រូវការជំនួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ របបអាហាររបស់អ្នក ឬកាត់បន្ថយការប្រើគ្រឿងស្រវឹង និងការជក់បារី អ្នកគួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។^៦

អ្នកគួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកផងដែរអំពី ការប្រើថ្នាំពេទ្យ ឬថ្នាំបំប៉នបន្ថែមណាមួយដែល អ្នកប្រើ រួមមាន ឱសថបុរាណ និងថ្នាំចិនបុរាណ ដោយសារ ថ្នាំមួយចំនួនអាចបង្កបញ្ហាអាចក្លាយជា ថ្លើមរបស់អ្នក បើសិនអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។⁷




7

សូមទៅជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកជាប្រចាំ

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែល អ្នកត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នករៀងរាល់ប្រាំមួយខែម្តង ឬតាមការណែនាំដើម្បី ពិនិត្យមើល បើសិនមានការខូចខាតថ្លើមណាមួយ។ អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាញឹកញាប់មិនមានសញ្ញា ឬ រោគសញ្ញាណាមួយឡើយ។ បើសិនអ្នករង់ចាំរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺនោះ វីរុសនេះអាចបណ្តាលឱ្យមាន គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង ដែលអាចមិនវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពដើមវិញបានទេ។ វិធីតែមួយគត់ ដើម្បីដឹងពីបញ្ហានេះ ត្រូវ ពិនិត្យមើលថ្លើមឱ្យបានទៀងទាត់។^៥

បើសិនវីរុសចាប់ផ្តើមបង្កការខូចខាតដល់ថ្លើមរបស់អ្នក មានថ្នាំដែល អ្នកអាចប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីវីរុសនេះ។

អ្នកអាចត្រូវការទៅជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់ថែមទៀត បើសិនមានការណែនាំ ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការព្យាបាល។



តើអ្នកបានដឹងទេ ?

ថ្លើមមិនមានសរសៃឈាមណាមួយដែលមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នោះទេ។ មានកន្សោម (ឬ ចង) នៃជាលិកានៅជុំវិញថ្លើម ដែលអាចមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ បើសិនថ្លើមលាតសន្ធឹង។ ហើយនេះជាមូលហេតុដែល អ្នកមិនមានរោគសញ្ញាណាមួយពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រហូតដល់ថ្លើមរបស់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។^៨



8 ទទួលការព្យាបាល បើសិនចាំបាច់

មិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ត្រូវការព្យាបាលទេ ដោយសារតែវីរុសនេះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងគ្នា ។ ក្នុងដំណាក់កាលខ្លះ វីរុសអាចសកម្មយ៉ាងខ្លាំង និងបង្កឱ្យមានរបួសដល់ថ្លើមរបស់អ្នក។ នៅពេល អ្នកទៅជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ដើម្បីពិនិត្យមើលថ្លើម ពួកគេអាចដឹងថាវីរុសនេះសកម្មយ៉ាងណា ដោយការធ្វើតេស្តឈាម ហើយថាតើអ្នកត្រូវការចាប់ផ្តើម ព្យាបាលឬអត់។^១

ដំណាក់កាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B		
ស្ងៀមស្ងាត់	ដំណាក់កាល 1 ការអត់ឱនភាពស្មារតីនឹងជំងឺ	វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B កំពុងចម្លងខ្លួនវា ប៉ុន្តែមិនមានសកម្មភាពការខូចខាតថ្លើម ទេ។
ការខូចខាត	ដំណាក់កាល 2 ការរលាយសម្ពាធភាពស្មារតីនឹងជំងឺ	វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B កំពុងវាយលុកប្រព័ន្ធភាពស្មារតីនឹងជំងឺ ហើយប្រព័ន្ធភាពនឹងស្មារតីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងតបវិញ។ ថ្លើមកំពុងទទួលរងការខូចខាត។
ការគ្រប់គ្រង	ដំណាក់កាល 3 ការគ្រប់គ្រងភាពស្មារតីនឹងជំងឺ	ប្រព័ន្ធភាពស្មារតីនឹងជំងឺមានវីរុសស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ហើយមិនមានការខូចខាតថ្លើមថែមទៀតទេ។
ការគេចវេះ	ដំណាក់កាល 4 ការគេចវេះភាពស្មារតីនឹងជំងឺ	វីរុសសកម្មម្តងទៀត ហើយថ្លើមទទួលរងការខូចខាត។

ការប្រើថ្នាំទូទៅច្រើនបំផុតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុសដែល អ្នកលេបរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល មួយឆ្នាំ ឬយូរជាងនេះ ដូចដែលបានណែនាំដោយគ្រូពេទ្យអ្នក។

បើសិនអ្នកត្រូវការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អ្នកអាចត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញណាម្នាក់ លុះត្រាតែគ្រូពេទ្យ GP របស់អ្នក មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ គ្រូពេទ្យ GP របស់អ្នក និងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការបញ្ជូនទៅ អ្នកជំនាញថ្លើម បើសិនត្រូវការចាំបាច់។^១

ឯកសារយោង : 1. ASHM. (2012, September). [Hepatitis B and Primary Care Providers](#). Retrieved from ASHM. 2. ASHM. (2016, March). [Indications for HBV testing](#). Retrieved from ASHM 3. Department of Home Affairs. (n.d.). TIS National. Retrieved from [www.tisnational.gov.au/](#) 4. Hepatitis NSW. (2018, May 11). [Hep B testing for adults](#). Retrieved from Hepatitis NSW. 5. ASHM. (2019). [Hepatitis B](#). Retrieved from All good. 6. Hepatitis Queensland. (2019). [Living with Hepatitis](#). Retrieved from Hepatitis Queensland. 7. hep. (2019, March 4). [Natural Remedies and Hepatitis B](#). Retrieved from hepomag. 8. Stöppler, M. (2017, January 24). [Medical Definition of Liver Pain](#). Retrieved from MedicineNet. 9. Hep B Help. (2019). [New HBV Diagnosis – what now?](#) Retrieved from Hep B Help.